

فیژین فید

شربت ملین آنجیر و سنا (۱۲۰ میلی لیتر)

هر وعده ۵ میلی لیتری از این شربت خوراکی حاوی ۰.۵ میلی لیتر عصاره آنجیر، ۰.۳ میلی لیتر عصاره سنا میوه سنا (پتولون مواده موثره است. همچنین این محصول حاوی ساکاروز، عصاره مالت (حاوی دکستروز (گلوکز))، بنزوتیک اسید (E۳۱۰)، متیل-سائالین، روغن میخک، روغن نمانا، روغن کشنیز و متیل سالیسیلات است. لطفاً قبل از استفاده از دارو، بروشور را مطالعه نمایید.

موارد مصرف :

ملین، ضد یبوست های معلق.

مقدار و طریقه مصرف:

- قبل از اولین استفاده از دارو، ظرف دارو را چک کنید، در صورت باز بودن و عدم پلمب بودن درب از مصرف دارو خودداری نمایید.
- کودکان ۲-۵ سال : ۲/۵ میلی لیتر (۱ قاشق چایخوری) بیکار در روز (قبل از خواب)
- کودکان ۵-۱۲ سال : ۵ میلی لیتر (۱ قاشق چایخوری) بیکار در روز (قبل از خواب)
- بالای ۱۲ سال و بزرگسالان ۱-۱۰ میلی لیتر (۲ قاشق چایخوری) بیکار در روز (قبل از خواب)
- دارو بیشتر از ۷ روز متوالی (یک هفته) استفاده نشود.

عوارض جانبی

- اکثر مصرف کنندگان دچار عوارض خاصی نمی شوند، در برخی از موارد ممکن است عوارض زیر بروز دهند:
- اسهال آبکی (یبوست شدید و با همراه خون، کاهش تنگ و آب بدن، خفگی، نفخ، متشنج، کاهش وزن)
- تغییر رنگ مدفوع و ابرار (قرمز یا زرد)
- اختلالات قلبی یا کبدی
- در صورت بروز هر نوع حساسیت دارویی در زمان مصرف این فرآورده، با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.

موارد عدم مصرف

- این دارو برای کودکان بالای ۲ سال و بزرگسالان مناسب است.
- دارو در موارد زیر مصرف نشود:
- اگر به هر یک از ترکیبات آن حساسیت (الرژی) دارید.
- اگر سابقه دردهای شکمی را دارید.
- اگر احساس بیماری و مریضی خاصی دارید و یا دچار بیماری و مریضی خاصی هستید.
- اگر دچار انسداد روده شده اید.
- اگر نباید برخی از ترکیبات فنی را مصرف نمایید، مگر پزشک شما این دارو را برایتان تجویز کرده باشد (این دارو حاوی دکستروز (گلوکز) و ساکاروز است).
- این دارو در هر وعده مصرف ۵ میلی لیتری حاوی ۸۲۲مگرم قند است. اگر دچار بیماری دیابت هستید به این نکته توجه فرمائید.
- برای مدت طولانی از این دارو استفاده نکنید (بصورت عمومی و نوزادان بیش از یک هفته نباشد). مگر پزشک شما مدت زمان مصرف بیشتری را تجویز کرده باشد.
- اگر دچار بیماری التهابی روده هستید، قبل از مصرف دارو حتماً با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.
- مصرف این دارو برای بانوان باردار و شیرده ممنوع است.

تشریحات نگهداری

- در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد، در جای خشک و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

بسته بندی

- ۱ عدد شربت ۱۲۰ میلی لیتری با بروشور در جبهه مقوایی.

Fijin Fid

Laxative Syrup of Fig and Senna (120 ml)

Each 5 ml contains :

0.5 ml liquid extract from Fig fruit
0.4 ml liquid extract from Senna fruit

Also contains sucrose, malt extract (dextrose (glucose)), benzoic acid (E210), methylparaben, clove oil, peppermint oil, coriander oil and methylsalicylate
Please read this leaflet carefully before you start to use your medicine.
Contact your physician or pharmacist if you have any question.

Product Description

Fijin is an herbal syrup from Fig Fruit and Senna Fruit extract which relieves occasional constipation.

Indications

Laxative, Relieves occasional constipation.

Instruction of use

Check the cap seal is not broken before first use. If it is, do not take the medicine.

- Take the amount shown in the table opposite.
- Adults and children of 12 years and over: Take two 5 ml spoonful at bedtime only.
- Children of 5 to 12 years: Give one 5 ml spoonful at bedtime only.
- Children of 2 to 5 years: Give half a 5 ml spoonful at bedtime only.
- This medicine should be swallowed.
- Do not give to children under 2 year.
- Do not take more than the amount recommended above.
- If symptoms do not go away talk to your pharmacist or doctor.
- If you take too much: Talk to a doctor straight away.

Side effects

Most people will not have problems, but some may get some.

- If you take it for a long time, you may get:
- Watery diarrhea (which may be severe or have blood in it), fluid and body salt loss, muscle weakness, weight loss
- Red or yellow coloration of the faeces and urine
- Heart or kidney problems
- If any side effect becomes severe, or you notice any side effect not listed here, please tell your pharmacist or doctor.
- This medicine contains 2.8 g of total sugars per 5 ml spoonful. This should be taken into account if you have diabetes.

Contradictions and precautions for use

Stop using Fijin Syrup in case of allergy to any of its constituents.

This medicine can be taken by adults and children aged 2 year and over.

However, some people should not take this medicine or should seek the advice of their pharmacist or doctor first.

Do not take:

- If you are allergic to any of the ingredients
- If you have stomach pain
- If you are feeling sick or being sick
- If you have a blockage in your intestine
- If you have an intolerance to some sugars, unless your doctor tells you to (this medicine contains dextrose (glucose) and sucrose)
- For long periods of time (**in general more than a week**), unless your doctor tells you to

Talk to your pharmacist or doctor:

- If you have inflammatory bowel disease

Pregnancy and breastfeeding

You cannot take this medicine if you are pregnant or breastfeeding.

Storage

Store at 25°C.

Keep out of reach of children.

Packaging

1 Syrup (120 ml) with leaflet in a carton-box.